

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

皮膚科 【CTCL】

レジメン名称 : モガムリズマブ (1-4回目)

レジメン説明 : 2018/10/4承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)ポテリジオ点滴静注20mg 5mL	1mg/kg		1.05mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:モガムリズマブ (1-4回目) 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	ポラミン注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:モガムリズマブ (1-4回目) 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1	5mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	水溶性ハイドロコルトン注射液 100mg 2ml 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:モガムリズマブ (1-4回目) 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1	100mg 50mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)ポテリジオ点滴静注20mg 5mL 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:モガムリズマブ (1-4回目) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4						

RP	オーダーコメント
01	ルートキーブ
02	ポテリジオ投与30分前までに投与
03	ポテリジオ投与30分前までに投与

インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

皮膚科 【CTCL】

レジメン名称 : モガムリズマブ (5回目以降)

レジメン説明 : 2018/10/4承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)ポテリジオ点滴静注20mg 5mL	1mg/kg		1.05mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:モガムリズマブ (5回目以降) 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	ポラミン注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:モガムリズマブ (5回目以降) 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1	5mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	水溶性ハイドロコルトン注射液 100mg 2ml 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:モガムリズマブ (5回目以降) 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1	100mg 50mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)ポテリジオ点滴静注20mg 5mL 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:モガムリズマブ (5回目以降) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 4						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	ポテリジオ投与30分前までに投与
03	ポテリジオ投与30分前までに投与