

共通

レジメン名称 : CHOP療法

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	緩徐に静注	(化)オコピン注射用1mg	1.4mg/m2		2mg
04	点滴静注	(化)アドリアン注用※	50mg/m2		55mg/m2
05	点滴静注	(化)注射用エトキシ※	750mg/m2		760mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液200mL 療法名:CHOP療法 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	200mL		投与順 1								
02	点滴静注	ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:CHOP療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0.3mg 100mL		投与順 2								
03	緩徐に静注	(化)オコピン注射用1mg 生理食塩液 20mL プラアンブル 療法名:CHOP療法 緩徐に静注: 投与経路確保 末梢サブルート1	0mg 20mL		投与順 3								
04	点滴静注	(化)アドリアン注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:CHOP療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 4								
05	点滴静注	(化)注射用エトキシ※ ソルテム3A 輸液500mL 療法名:CHOP療法 点滴静注: *点滴時間 3時間で	0mg 500mL		投与順 5								
<次ページあり>													

