

皮膚科

レジメン名称 : リツキサン療法 皮膚科

レジメン説明 : 2015移行により生成  
2018.10.31 末梢ルートニゾロン削除 → ソル・メ・ロール

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)リツキサン点滴静注※	375mg/m2		380mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:リツキサン療法 皮膚科 点滴静注: *点滴速度 50ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1								
02	静注(ワンショット)	ホパラミン注 5mg 1ml 療法名:リツキサン療法 皮膚科 静脈内注射 (ワンショット):	1A		投与順 2								
03	点滴静注	ソル・メ・ロール静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:リツキサン療法 皮膚科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	125mg 100mL		投与順 3								
04	点滴静注	(化)リツキサン点滴静注※ 生理食塩液 500mL ソフトバグ「テルモ」 療法名:リツキサン療法 皮膚科 点滴静注: *点滴速度 25ml/hr 投与経路:末梢サブルート1	0mg 0mL		投与順 4								

RP	オーダーコメント
01	keep
04	25ml/hで開始。開始後1時間著変なければ100ml/hにdose-up。さらに1時間著変なければ200ml/hにdose-up。