

皮膚科

レジメン名称 : リツキサシ + THP-COP療法 皮膚科

レジメン説明 : 2015移行により生成
2018.10.31 マルプレトニゾロン削除 → ソルマトロール

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)リツキサシ点滴静注※	375mg/m2		380mg/m2
06	緩徐に静注	(化)オコヒン注射用1mg	1mg/m2		2mg
07	点滴静注	(化)テラルビシ注射用10mg	30mg/m2		33mg/m2
08	点滴静注	(化)注射用エンドキサン※	500mg/m2		515mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2							
01	点滴静注	ソルマ3A 輸液500mL 療法名:リツキサシ + THP-COP療法 皮膚科 点滴静注: *点滴速度 50ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		投与順 1	投与順 1							
02	静注(ワンショット)	ボラミン注 5mg 1ml 療法名:リツキサシ + THP-COP療法 皮膚科 静脈内注射 (ワンショット):	1A		投与順 2								
03	点滴静注	ソルマトロール静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:リツキサシ + THP-COP療法 皮膚科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	125mg 100mL		投与順 3								
04	点滴静注	(化)リツキサシ点滴静注※ 生理食塩液 500mL ソフトバグ「テル」 療法名:リツキサシ + THP-COP療法 皮膚科 点滴静注: *点滴速度 25ml/hr 投与経路:末梢サブルート1	0mg 0mL		投与順 4								
05	点滴静注	ラモセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:リツキサシ + THP-COP療法 皮膚科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.3mg 100mL			投与順 2							
	<次ページあり>												

皮膚科

レジメン名称 : リツキサシ + THP-COP療法 皮膚科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2					
06	緩徐に静注	(化)オコピシ注射用1mg 生理食塩液 20mL プラソプル 療法名:リツキサシ + THP-COP療法 皮膚科 緩徐に静注:	0mg 20mL			投与順 3					
07	点滴静注	(化)テラビシ注射用10mg 大塚糖液 5% 100mL プラソトル 療法名:リツキサシ + THP-COP療法 皮膚科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL			投与順 4					
08	点滴静注	(化)注射用エトキシシ※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:リツキサシ + THP-COP療法 皮膚科 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL			投与順 5					

RP	オーダーコメント
01	keep
04	25ml/hで開始。開始後1時間著変なければ100ml/hにdose-up。さらに1時間著変なければ200ml/hにdose-up。