

皮膚科

レジメン名称 : DTIC単剤療法 (1日間) 【アプレビタント内服】

レジメン説明 : 2020/4/24承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)タカハジン注用100 100mg	1000mg/m2		1050mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液200mL 療法名:DTIC単剤療法 (1日間) 【アプレビタント内服】 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1	200mL		投与順 1								
02	点滴静注	アロキン静注0.75mg 5mL デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:DTIC単剤療法 (1日間) 【アプレビタント内服】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 50mL		投与順 2								
03	点滴静注	(化)タカハジン注用100 100mg 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:DTIC単剤療法 (1日間) 【アプレビタント内服】 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		投与順 3								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	輸液バッグ、ルート遮光