

皮膚科

レジメン名称 : DTIC単剤療法 (5日間) 【アプレピタント内服】

レジメン説明 : 2020/4/24承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)タカハジン注用100 100mg	200mg/m2		210mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液200mL 療法名:DTIC単剤療法 (5日間) 【アプレピタント内服】 点滴静注: *点滴時間 45分で 投与経路:末梢ルートメイン1	200mL		投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1		
02	点滴静注	グレンセトン静注液3mg「NK」 3mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:DTIC単剤療法 (5日間) 【アプレピタント内服】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 50mL		投与順 2	投与順 2	投与順 2	投与順 2	投与順 2		
03	点滴静注	(化)タカハジン注用100 100mg 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:DTIC単剤療法 (5日間) 【アプレピタント内服】 点滴静注: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 3	投与順 3	投与順 3	投与順 3	投与順 3		

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	輸液バッグ、ルート遮光