

皮膚科

レジメン名称 : ニボルマブ + 化^レリムマブ療法 (1-4回目) 皮膚科

レジメン説明 : 2018/7/30承認

2018/9/12 ニボルマブ80mg/bodyへ

2019/6/3 nivo→ipiの間の生食50mLに30分観察時間コメント挿入

2020/1/22 nivo80mgのコメントに「CVポート、PICCからの投与不可」を追記

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)オプジーボ点滴静注※	80mg		80mg
05	点滴静注	(化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL	3mg/kg		3.15mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:ニボルマブ + 化 ^レ リムマブ療法 (1-4回目) 皮膚科 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1						
02	点滴静注	ポラミン注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:ニボルマブ + 化 ^レ リムマブ療法 (1-4回目) 皮膚科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	5mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)オプジーボ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:ニボルマブ + 化 ^レ リムマブ療法 (1-4回目) 皮膚科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						
04	点滴静注	生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:ニボルマブ + 化 ^レ リムマブ療法 (1-4回目) 皮膚科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	50mL		投与順 4						
05	点滴静注	(化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:ニボルマブ + 化 ^レ リムマブ療法 (1-4回目) 皮膚科 点滴静注: <次ページあり>	0mg 100mL		投与順 5						

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

皮膚科

レジメン名称 : ニボルマブ + 化^レリムマブ療法 (1-4回目) 皮膚科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		*点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1									

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	0.2又は0.22 μ mのフィルターを使用 ※CVポート、PICCからの投与不可
04	オ ^フ ジ ^ー ホ ^ー 終了後30分かけて投与 (ヤ ^ー ホ ^ー イ開始までの30分の観察期間用)
05	オ ^フ ジ ^ー ホ ^ー 終了から30分空けて投与開始 最終濃度 : 1~4mg/mL 0.2~1.2 μ mのフィルターを使用

皮膚科

レジメン名称 : ニボルマブ + 化^レリムマブ^ブ療法 (5回目以降) 皮膚科

レジメン説明 : 2018/7/30承認
2018/9/12 240mg/bodyへ

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)オ ^ブ ジ ^ン ホ ^ン 点滴静注※	240mg		240mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1							
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:ニボルマブ + 化 ^レ リムマブ ^ブ 療法 (5回目以降) 皮膚 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1							
02	点滴静注	ポ ^ラ ラ ^シ ン ^注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL プ ^ラ ボ ^ト ル 療法名:ニボルマブ + 化 ^レ リムマブ ^ブ 療法 (5回目以降) 皮膚 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	5mg 50mL		投与順 2							
03	点滴静注	(化)オ ^ブ ジ ^ン ホ ^ン 点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:ニボルマブ + 化 ^レ リムマブ ^ブ 療法 (5回目以降) 皮膚 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3							

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	0.2又は0.22 μmのフィルターを使用

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

皮膚科

レジメン名称 : 【q4w】ニボルマブ[®] + イピリマブ[®] (5回以降) 皮膚

レジメン説明 : 2020/9/30承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)オプジーボ [®] 点滴静注※	480mg		480mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: 【q4w】ニボルマブ [®] + イピリマブ [®] (5回以降) 皮膚 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	ホウラン注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名: 【q4w】ニボルマブ [®] + イピリマブ [®] (5回以降) 皮膚 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	5mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)オプジーボ [®] 点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名: 【q4w】ニボルマブ [®] + イピリマブ [®] (5回以降) 皮膚 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	0.2又は0.22 μmのフィルターを使用