

皮膚科

レジメン名称 : ヤーボイ療法

レジメン説明 : 2015移行により生成  
2018/10/3 ヤーボイ溶解用生食量を100mL→50mLに変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL	3mg/kg		3.15mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:ヤーボイ療法 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1								
02	点滴静注	ボラミン注 5mg 1ml 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:ヤーボイ療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	5mg 50mL		投与順 2								
03	点滴静注	生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:ヤーボイ療法 点滴静注: *点滴時間 15分で 投与経路:末梢サブルート1	50mL		投与順 3								
04	点滴静注	(化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:ヤーボイ療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 4								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
04	調製後の濃度が1~4mg/mLとなるように生食量を調節する ※本剤は0.2~1.2μmのインラインフィルターを通す