

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

皮膚科

レジメン名称 : PTX + CBDCA 【アプビ°タト内服】

レジメン説明 : 2020/10/30承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

| RP | 手技   | 薬剤名称                 | 標準値(1回量) | 標準値 | 上限値      |
|----|------|----------------------|----------|-----|----------|
| 03 | 点滴静注 | (化)パクリタキセル点滴静注液※     | 200mg/m2 |     | 210mg/m2 |
| 04 | 点滴静注 | (化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ | 0mg      |     | 1000mg   |

| RP | 手技   | 薬剤名称  | 用量/単位                                   | 処方1回量 | Day1  |  |  |  |  |  |  |
|----|------|---|---|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 01 | 点滴静注 | 生理食塩液 250mL ソフトバック<br>療法名:PTX + CBDCA 【アプビ°タト内服】<br>点滴静注:<br>*点滴時間 5時間で<br>投与経路:末梢ルートメイン1   | 250mL                                   |       | 投与順 1 |  |  |  |  |  |  |
| 02 | 点滴静注 | デキスト注射液(デカトロン後発)※<br>ホウリン注 5mg 1mL<br>ガスター注射液20mg 2mL<br>アロキン静注0.75mg 5mL<br>生食溶解液 100mL キットH<br>療法名:PTX + CBDCA 【アプビ°タト内服】<br>点滴静注:<br>*点滴時間 30分で<br>投与経路:末梢サブルート1 | 9.9mg<br>5mg<br>20mg<br>0.75mg<br>100mL |       | 投与順 2 |  |  |  |  |  |  |
| 03 | 点滴静注 | (化)パクリタキセル点滴静注液※<br>大塚糖液 5% 500mL ソフトバック<br>療法名:PTX + CBDCA 【アプビ°タト内服】<br>点滴静注:<br>*点滴時間 3時間で<br>投与経路:末梢サブルート1  | 0mg<br>500mL                            |       | 投与順 3 |  |  |  |  |  |  |
| 04 | 点滴静注 | (化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※<br>生理食塩液 250mL ソフトバック<br>療法名:PTX + CBDCA 【アプビ°タト内服】<br>点滴静注:<br>*点滴時間 90分で<br>投与経路:末梢サブルート1  | 0mg<br>250mL                            |       | 投与順 4 |  |  |  |  |  |  |

| RP | オーダーコメント |
|----|----------|
| 01 | ルートキープ   |

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

皮膚科

レジメン名称 : PTX + CBDCA 【アプレタ内服】

| RP | オーダーコメント               |
|----|------------------------|
| 03 | 0.22 $\mu$ m以下のフィルター使用 |