印刷日時： 2020-05-08 13:30:13

インターバル日数： 14 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

皮膚科

レジメン名称：low dose FP　療法

レジメン説明：2015移行により生成
2018/7/20 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ「ﾃﾊﾞ」→「武田ﾃﾊﾞ」の変更に伴い修正

適用条件：
除外条件：
体表面積計算式： 男性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184 女性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184
AUC計算式 ： 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重× 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「ﾏﾙｺ」※	10mg/m2		12mg/m2
04	点滴静注	(化)5-FU注※	600mg/m2		650mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	
01	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:low dose FP　療法 点滴静注: ＊点滴速度 67ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		1回	1回	1回	1回	1回		
02	点滴静注	ﾗﾓｾﾄﾛﾝ塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生食溶解液 100mL ｷｯﾄH 療法名:low dose FP　療法 点滴静注: ＊点滴速度 100ｍｌ/hr 投与経路:末梢サブルート1	0.3mg 100mL		1回	1回	1回	1回	1回		
03	点滴静注	(化)ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「ﾏﾙｺ」※ 生理食塩液 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ「ﾃﾙﾓ」 療法名:low dose FP　療法 点滴静注: ＊点滴速度 60ｍｌ/hr 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		1回	1回	1回	1回	1回		
04	点滴静注	(化)5-FU注※ 生理食塩液 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ「ﾃﾙﾓ」 療法名:low dose FP　療法 点滴静注: ＊点滴速度 60ｍｌ/hr 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		1回	1回	1回	1回	1回		
05	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:low dose FP　療法 点滴静注: ＊点滴速度 250ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		2回	2回	2回	2回	2回		
	<次ページあり>										

印刷日時： 2020-05-08 13:30:13

インターバル日数： 14 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

皮膚科

レジメン名称：low dose FP　療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	
06	点滴静注	ﾌﾛｾﾐﾄﾞ(ﾗｼｯｸｽ後発)注20mg「武田ﾃﾊﾞ」 2mL 生理食塩液　50mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ 療法名:low dose FP　療法 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	20mg 50mL		1回	1回	1回	1回	1回	1回	
07	ロック	ﾍﾊﾟﾌﾗｯｼｭ100単位/mLｼﾘﾝｼﾞ10mL 療法名:low dose FP　療法 ロック:	1本		1回	1回	1回	1回	1回		
08	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:low dose FP　療法 点滴静注: ＊点滴速度 200ｍｌ/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL							3回	