印刷日時： 2020-05-08 13:25:52

インターバル日数： 30 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

皮膚科

レジメン名称：CDDP + ADM

レジメン説明：2017/6/27承認。それに伴い、後）CAV療法は削除。SCCに対してADMは保険適応外のため、倫理委員会申請済み。
2018/7/20 ﾌﾛｾﾐﾄﾞ「ﾃﾊﾞ」→「武田ﾃﾊﾞ」の変更に伴い修正

適用条件：Grade4の白血球減少・好中球減少、Grade3以上の発熱性好中球減少症・悪心嘔吐・下痢を生じた場合は1段階減量。
1段階減量：CDDP、ADM 20mg/m²
2段階減量：CDDP、ADM 15mg/m²

除外条件：心機能異常またはその既往、重篤な腎機能障害（＜60ml/min）、ADMまたはCDDPなどに対し重篤な過敏症の既往がある場合。妊娠・妊婦の可能性のある婦人・授乳婦

体表面積計算式： 男性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184 女性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重× 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	緩徐に静注	(化)ｱﾄﾞﾘｱｼﾝ注用※	30mg/m2		31.5mg/m2
05	点滴静注	(化)ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「ﾏﾙｺ」※	25mg/m2		26.25mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
01	点滴静注	生理食塩液 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ「ﾃﾙﾓ」 療法名:CDDP + ADM 点滴静注: ＊点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		09:00 11:00	09:00 11:00	09:00 11:00				
02	点滴静注	生食溶解液 100mL ｷｯﾄH 療法名:CDDP + ADM 点滴静注: ＊点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		13:00	13:00	13:00				
03	点滴静注	ｸﾞﾗﾆｾﾄﾛﾝ点滴静注ﾊﾞｯｸﾞ3mg/100mL「NK」 ﾃﾞｷｻｰﾄ注射液(ﾃﾞｶﾄﾞﾛﾝ後発)※ 療法名:CDDP + ADM 点滴静注: ＊点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 6.6mg		13:00	13:00	13:00				
04	緩徐に静注	(化)ｱﾄﾞﾘｱｼﾝ注用※ 生理食塩液 20mL ﾌﾟﾗｱﾝﾌﾟﾙ 療法名:CDDP + ADM 緩徐に静注: 投与経路確保 末梢サブルート1	0mg 20mL		14:00						
05	点滴静注 ＜次ページあり＞	(化)ｼｽﾌﾟﾗﾁﾝ点滴静注「ﾏﾙｺ」※ 生理食塩液 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ「ﾃﾙﾓ」 療法名:CDDP + ADM	0mg 500mL		14:10	14:00	14:00				

印刷日時： 2020-05-08 13:25:52

インターバル日数： 30 日　　基準日： Day 1　　最大クール数：0クール

皮膚科　　レジメン名称：CDDP + ADM

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
		点滴静注: ＊点滴時間 150分で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	ﾌﾛｾﾐﾄﾞ(ﾗｼｯｸｽ後発)注20mg｢武田ﾃﾊﾞ｣ 2mL 生理食塩液　50mL ﾌﾟﾗﾎﾞﾄﾙ 療法名:CDDP + ADM 点滴静注: ＊点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1	20mg 50mL		16:40	16:30	16:30				
07	点滴静注	ｿﾙﾃﾞﾑ3A 輸液500mL 療法名:CDDP + ADM 点滴静注: ＊点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	500mL		16:40 18:40	16:30 18:30	16:30 18:30				
08	点滴静注	生理食塩液 500mL ｿﾌﾄﾊﾞｯｸﾞ｢ﾃﾙﾓ｣ 療法名:CDDP + ADM 点滴静注: ＊点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL					09:00 12:00			

RP	オーダーコメント
02	ルートキープ
04	5分かけて静注