

皮膚科 【soft tissue sarcoレジメン名称 : トラベクテジン療法 皮膚科

レジメン説明 : 2018/11/22承認

適用条件 : <減量基準>

通常用量 : 1.2mg/m²
 1段階減量 : 1.0mg/m²
 2段階減量 : 0.8mg/m²

除外条件 : 高度な骨髄抑制のある患者、本剤に対して過敏症のある患者、妊婦又は妊娠している可能性のある患者

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	中心静脈注射	(化)【要予約】ヨネテリス点滴静注用※	1.2mg/m ²		1.26mg/m ²

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	中心静脈注射	生食溶解液 100mL キットH 療法名:トラベクテジン療法 皮膚科 中心静脈注射: *点滴時間 24時間で 投与経路:CVルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	中心静脈注射	グラネトロン点滴静注パック 3mg/100mL「NK」 デキサト注射液(デキサメタゾン後発)※ 療法名:トラベクテジン療法 皮膚科 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVサブルート1	3mg 9.9mg		投与順 2						
03	中心静脈注射	(化)【要予約】ヨネテリス点滴静注用※ 生理食塩液 500mL ソフトパック「テルモ」 療法名:トラベクテジン療法 皮膚科 中心静脈注射: *点滴時間 24時間で 投与経路:CVサブルート1	0mg 500mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	必ず中心静脈から投与 24時間かけて