

皮膚科 【soft tissue sarcoレジメン名称 : AI療法 皮膚科 【イマド<sup>®</sup>内服】

レジメン説明 : 2018/2/20承認  
 2018/3/2医師の依頼で、生食500mL+イマド<sup>®</sup>20mLの点滴速度を4時間→6時間に変更。ウミキサン : 緩徐に静注→生食100mLに溶解し、30分で点滴静注へ変更。  
 2018/3/22 ウミキサン1回分の投与順をイマド<sup>®</sup>の前に設置し、コメントイマド<sup>®</sup>投与開始後4時間後、8時間後に変更。

適用条件 : <減量基準>

レベル0 ADM : 30mg/m<sup>2</sup> day1,2  
 IFO : 2g/m<sup>2</sup> day1~5  
 レベル-1 ADM : 24mg/m<sup>2</sup> day1,2  
 IFO : 1.6g/m<sup>2</sup> day1~5  
 レベル-2 ADM : 19mg/m<sup>2</sup> day1,2  
 IFO : 1.3g/m<sup>2</sup> day1~5

除外条件 : コントロール不良な糖尿病・高血圧、心筋梗塞や狭心症の既往、ヘーヌカー移植術後、重篤な腎機能障害、治療を要する感染症、妊娠中・授乳中

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)アトリアン注用※	30mg/m2		31.5mg/m2
04	点滴静注	(化)注射用イマド <sup>®</sup> 1g	2000mg/m2		2100mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5
01	点滴静注	グラセロン点滴静注バッグ <sup>®</sup> 3mg/100mL「NK」 デキサト注射液(デカト <sup>®</sup> 後発)※ 療法名:AI療法 皮膚科 【イマド <sup>®</sup> 内服】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 9.9mg		投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1
02	点滴静注	(化)アトリアン注用※ 大塚糖液 5% 100mL プラボ <sup>®</sup> トル 療法名:AI療法 皮膚科 【イマド <sup>®</sup> 内服】 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 2	投与順 2			
03	点滴静注	ウミキサン注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:AI療法 皮膚科 【イマド <sup>®</sup> 内服】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3	投与順 3	投与順 2	投与順 2	投与順 2
04	点滴静注	(化)注射用イマド <sup>®</sup> 1g 生理食塩液 500mL ソフトバッグ <sup>®</sup> 「テルモ」 療法名:AI療法 皮膚科 【イマド <sup>®</sup> 内服】	0mg 500mL		投与順 4	投与順 4	投与順 3	投与順 3	投与順 3
<次ページあり>									