

脳神経外科

レジメン名称 : 後)ICE療法

レジメン説明 : 2015移行により生成  
2019/9/26 ザンタック→ガスターへ変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
07	中心静脈注射	(化)エト <sup>®</sup> シ <sup>®</sup> 点滴静注液100mg「サト <sup>®</sup> 」5mL	60mg/m <sup>2</sup>		70mg/m <sup>2</sup>
08	中心静脈注射	(化)注射用イマ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> 1g	900mg/m <sup>2</sup>		950mg/m <sup>2</sup>
10	中心静脈注射	(化)シス <sup>®</sup> ラチ <sup>®</sup> 点滴静注「マルコ」※	20mg/m <sup>2</sup>		22mg/m <sup>2</sup>

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
01	中心静脈注射	ソルテ <sup>®</sup> ム3A 輸液500mL 療法名:後)ICE療法 中心静脈注射: *点滴時間 6時間で 投与経路:CVルートメイン1	500mL		14:00 20:00						
02	中心静脈注射	ソルテ <sup>®</sup> ム3A 輸液500mL 療法名:後)ICE療法 中心静脈注射: *点滴時間 6時間で 投与経路:CVルートメイン1	500mL			02:00					
03	中心静脈注射	フジ <sup>®</sup> オ 35輸液 500mL アス <sup>®</sup> ラカリウム注10mEq 10mL 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:後)ICE療法 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:CVルートメイン1	500mL 1A 6.5mL			08:00	08:00	08:00	08:00	08:00	
04	中心静脈注射	ソルテ <sup>®</sup> ム3A 輸液500mL ガスター注射液20mg 2mL メイロン静注 8.4% 20mL 療法名:後)ICE療法 中心静脈注射: *点滴時間 2時間で 投与経路:CVルートメイン1	500mL 1A 1A			10:00	10:00	10:00	10:00	10:00	
05	中心静脈注射	生食溶解液 100mL キットH ラモセ <sup>®</sup> ロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」2mL デキ <sup>®</sup> サート注射液(デ <sup>®</sup> カ <sup>®</sup> ト <sup>®</sup> 後発)※	100mL 1A 0mg			11:30	11:30	11:30	11:30	11:30	
	<次ページあり>										









脳神経外科

レジメン名称 : 後)ICE療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day7						
13	中心静脈注射	カルゲム3A 輸液500mL カスター注射液20mg 2mL 療法名:後)ICE療法 中心静脈注射: *点滴時間 10時間で 投与経路:CVルートメイン1	500mL 1A								
14	中心静脈注射	フィジオ 35輸液 500mL 療法名:後)ICE療法 中心静脈注射: *点滴時間 5時間で 投与経路:CVルートメイン1	500mL								
15	中心静脈注射	フィジオ 35輸液 500mL 療法名:後)ICE療法 中心静脈注射: *点滴時間 6時間で 投与経路:CVルートメイン1	500mL								
16	中心静脈注射	フィジオ 35輸液 500mL 療法名:後)ICE療法 中心静脈注射: *点滴時間 8時間で 投与経路:CVルートメイン1	500mL		00:00 08:00 16:00						