

インターバル日数 : 5 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : High-dose MTX &amp; leucovorin rescue 療法

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
05	点滴静注	(化)リトレキセト注射液※	3500mg/m2		3675mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL メイロン静注 8.4% 20mL ガスター注射液20mg 2mL 療法名:High-dose MTX & leucovorin rescue 療法 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 20mL 20mg		1回					
02	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL メイロン静注 8.4% 20mL ガスター注射液20mg 2mL 療法名:High-dose MTX & leucovorin rescue 療法 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 40mL 20mg			1回	1回	1回	1回	1回
03	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL メイロン静注 8.4% 20mL 療法名:High-dose MTX & leucovorin rescue 療法 点滴静注: *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 40mL			4回	4回	4回	4回	4回
04	点滴静注	アロキソ静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:High-dose MTX & leucovorin rescue 療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 100mL			1回				
05	点滴静注	(化)リトレキセト注射液※ ソルテム3A 輸液500mL 療法名:High-dose MTX & leucovorin rescue 療法 点滴静注: <次ページあり>	0mg 500mL			1回				

インターバル日数 : 5 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : High-dose MTX &amp; leucovorin rescue 療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	
		*点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH ロイコホリン注3mg 1mL 療法名:High-dose MTX & leucovorin rescue 療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	100mL 0mg				4回	5回	4回	2回	

RP	オーダーコメント
04	MTXの投与前