

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : 後)CBDCA + VP-16 療法(カルボプラチンDay1)

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	450mg/m2		475mg/m2
04	点滴静注	(化)エトポシド点滴静注液100mg「サト」5mL	150mg/m2		160mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液200mL アスパラカリウム注10mEq 10mL デキスト注射液(デキストロン後発)※ 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:後)CBDCA + VP-16 療法(カルボプラチンDay1) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	200mL 1A 8.25mg 6.5mL		1回	1回	1回				
02	点滴静注	ラセトロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)CBDCA + VP-16 療法(カルボプラチンDay1) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	1A 100mL		1回	1回	1回				
03	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:後)CBDCA + VP-16 療法(カルボプラチンDay1) 点滴静注: *点滴速度 200m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 500mL		1回						
04	点滴静注	(化)エトポシド点滴静注液100mg「サト」5mL 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:後)CBDCA + VP-16 療法(カルボプラチンDay1) 点滴静注: *点滴速度 200m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	0mg 500mL		1回	1回	1回				
05	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:後)CBDCA + VP-16 療法(カルボプラチンDay1) 点滴静注:	500mL		2回	2回	2回				
	<次ページあり>										

