

共通 レジメン名称 : 後) 【増量】 テモダール注

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)テモダール点滴静注用100mg	200mg/m2		210mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:後) 【増量】 テモダール注 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1
02	点滴静注	テキサト注射液(テカト [®] 後発)※ グラセトン静注液3mg「NK」 3mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後) 【増量】 テモダール注 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 3mg 100mL		投与順 2	投与順 2	投与順 2	投与順 2	投与順 2
03	点滴静注	(化)テモダール点滴静注用100mg 大塚蒸留水 100mL 療法名:後) 【増量】 テモダール注 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 3	投与順 3	投与順 3	投与順 3	投与順 3

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	41mL/Vで溶解(2.5mg/mL)し、必要量を空ボトルへ移す。