

インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

脳神経外科

レジメン名称 : アハ<sup>スチン</sup>+テモ<sup>タール</sup>併用療法(放射線併用期)

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 : <ヘ<sup>バシマブ</sup>>

★Day1, 15, 29, 42に投与

<TMZ>

放射線併用期

★75mg/m<sup>2</sup>/日 1日1回空腹時

★42日間投与(放射線中断時49日まで延長可) →28日間休薬

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)アハ <sup>スチン</sup> 点滴静注用※	10mg/kg		10.5mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:アハ <sup>スチン</sup> +テモ <sup>タール</sup> 併用療法(放射線併用期) 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)アハ <sup>スチン</sup> 点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:アハ <sup>スチン</sup> +テモ <sup>タール</sup> 併用療法(放射線併用期) 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	初回90分、忍容性があれば2回目60分、それ以降30分まで短縮可