

インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

脳神経外科

レジメン名称 : アバ スチン+テモタール併用療法(維持療法期)

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 : <ヘパシスマブ>

★Day1, 15

<TMZ>

維持量法期

★150mg/m2/日 1日1回空腹時(2コース目から200mg/m2/日に増量可)

★Day1~5内服→day6~28休薬

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)アバ スチン点滴静注用※	10mg/kg		10.5mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:アバ スチン+テモタール併用療法(維持療法期) 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)アバ スチン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:アバ スチン+テモタール併用療法(維持療法期) 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	初回90分、認容性があれば2回目60分、それ以降30分まで短縮可