

インターバル日数 : 7 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通 レジメン名称 : 後)Weekly CDDP併用放射線化学療法

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
06	点滴静注	(化)シス ^テ ラチン点滴静注「マルコ」※	30mg/m ²		31.5mg/m ²

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3			
01	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバ ^グ 「テルモ」 療法名:後)Weekly CDDP併用放射線化学療法 点滴静注: *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		18:00		00:00 06:00	00:00 06:00			
02	点滴静注	フィソ ^オ 35輸液 500mL 療法名:後)Weekly CDDP併用放射線化学療法 点滴静注: *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			00:00	12:00 18:00	12:00 18:00			
03	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバ ^グ 「テルモ」 療法名:後)Weekly CDDP併用放射線化学療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			06:00					
04	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバ ^グ 「テルモ」 療法名:後)Weekly CDDP併用放射線化学療法 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			08:00 12:00					
05	点滴静注	テ ^キ ヤト注射液(テ ^カ ト ^ン 後発)※ ア ^ロ キ ^シ 静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)Weekly CDDP併用放射線化学療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 0.75mg 100mL			09:00					
06	点滴静注 <次ページあり>	(化)シス ^テ ラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバ ^グ 「テルモ」 療法名:後)Weekly CDDP併用放射線化学療法	0mg 500mL			09:30					

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : 後)Weekly CDDP併用放射線化学療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day0	Day1	Day2	Day3			
		点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1									
07	点滴静注	20%マンニトール注射液「YD」 300mL 療法名:後)Weekly CDDP併用放射線化学療法 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢サブルート1	200mL			11:30	08:30	08:30			
08	点滴静注	フィジオ 35輸液 500mL 療法名:後)Weekly CDDP併用放射線化学療法 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			16:00 20:00					
09	点滴静注	テキサー注射液(テカト [®] 後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)Weekly CDDP併用放射線化学療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	8.25mg 100mL				08:00	08:00			