

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通 レジメン名称 : 後)放射線・動注化学療法(カルボプラチン)

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	動脈注射(その他)	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		800mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:後)放射線・動注化学療法(カルボプラチン) 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		1回						
02	筋肉注射	アタラックス-P注射液(25mg/mL) 1mL ゾセロン注射液15mg 1mL 療法名:後)放射線・動注化学療法(カルボプラチン) 筋肉注射:	25mg 15mg		1回						
03	点滴静注	ラモセロン塩酸塩注射液0.3mg「EMEC」 2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)放射線・動注化学療法(カルボプラチン) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.3mg 100mL		1回						
04	動脈注射(その他)	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 療法名:後)放射線・動注化学療法(カルボプラチン) 動脈注射(その他):ワンショット	0mg		1回						