

放射線科

レジメン名称 : 5FU+MMC

レジメン説明 : 2017/10/25承認

2019/3/19 主科の医師より、MMCを緩徐に静注から50ccの生食に溶かして全開で落とすに変更したいとの連絡あり変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)マイトマイシン注用※	10mg/m2		10.5mg/m2
04	点滴静注	(化)5-FU注※	800mg/m2		840mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:5FU+MMC 点滴静注: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1	投与順 1	投与順 1	投与順 1			
02	点滴静注	アロキン静注0.75mg 5mL デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:5FU+MMC 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 100mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)マイトマイシン注用※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:5FU+MMC 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 3						
04	点滴静注	(化)5-FU注※ ソルテム3A 輸液500mL 療法名:5FU+MMC 点滴静注: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		投与順 4	投与順 3	投与順 3	投与順 3			
05	点滴静注	デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:5FU+MMC 点滴静注:	9.9mg 100mL			投与順 2	投与順 2	投与順 2			
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

放射線科

レジメン名称 : 5FU+MMC

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4			
		*点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1									

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	全開で投与