

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : 後)肝臓癌 (TAETAI) one-shot動注 放射線科

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	カテ注入:塞栓・溶解	(化)マイトマイシン注用※	10mg		10mg
03	カテ注入:塞栓・溶解	(化)エトルビシン塩酸塩注射用「NK」※	40mg		40mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	ラクテック注 500mL ソフトバッグ 療法名:後)肝臓癌 (TAETAI) one-shot動注 放射線 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		1回						
02	カテ注入:塞栓・溶解	(化)マイトマイシン注用※ 療法名:後)肝臓癌 (TAETAI) one-shot動注 放射線 カテテル下注入(塞栓・溶解術):	0mg		1回						
03	カテ注入:塞栓・溶解	(化)エトルビシン塩酸塩注射用「NK」※ 療法名:後)肝臓癌 (TAETAI) one-shot動注 放射線 カテテル下注入(塞栓・溶解術):	0mg		1回						