

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

放射線科

レジメン名称 : ネダプラチン+5-FU 【イメンド内服】

レジメン説明 : 2015移行により生成
2018/7/20 フロセミド「テバ」→「武田テバ」の変更に伴い修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 標準値(1回量) | 標準値 | 上限値 |
|----|------|-------------|----------|-----|-----------|
| 05 | 点滴静注 | (化)アクトラ静注用※ | 90mg/m2 | | 94.5mg/m2 |
| 06 | 点滴静注 | (化)5-FU注※ | 800mg/m2 | | 840mg/m2 |

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | | |
|----|------------|---|--------------------------|-------|-------|------|------|------|------|--|--|
| 01 | 点滴静注 | 生理食塩液 500mL ソフトバグ®「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:ネダプラチン+5-FU 【イメンド内服】 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 500mL 10mL | | 投与順 1 | | | | | | |
| 02 | 点滴静注 | 生理食塩液 500mL ソフトバグ®「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:ネダプラチン+5-FU 【イメンド内服】 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 500mL 10mL | | 投与順 2 | | | | | | |
| 03 | 点滴静注 | アロキソ静注0.75mg 5mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:ネダプラチン+5-FU 【イメンド内服】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 0.75mg 9.9mg 100mL | | 投与順 3 | | | | | | |
| 04 | 静注(ワンショット) | フロセミド(ラシックス後発)注20mg「武田テバ」 2mL 療法名:ネダプラチン+5-FU 【イメンド内服】 静脈内注射(ワンショット): 投与経路確保 末梢サブルート1 | 20mg | | 投与順 4 | | | | | | |
| 05 | 点滴静注 | (化)アクトラ静注用※ 生理食塩液 500mL ソフトバグ®「テルモ」 療法名:ネダプラチン+5-FU 【イメンド内服】 点滴静注: <次ページあり> | 0mg 500mL | | 投与順 5 | | | | | | |

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

放射線科

レジメン名称 : ネダプラチン+5-FU 【イメンド内服】

| RP | 手技 | 薬剤名称 | 用量/単位 | 処方1回量 | Day1 | Day2 | Day3 | Day4 | Day5 | | |
|----|------|---|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|
| | | *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1 | | | | | | | | | |
| 06 | 点滴静注 | (化)5-FU注※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 療法名:ネダプラチン+5-FU 【イメンド内服】 点滴静注: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン1 | 0mg 500mL | | 投与順 6 | 投与順 1 | 投与順 1 | 投与順 1 | 投与順 1 | | |
| 07 | 点滴静注 | 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:ネダプラチン+5-FU 【イメンド内服】 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1 | 500mL | | 投与順 7 | | | | | | |
| 08 | 点滴静注 | 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:ネダプラチン+5-FU 【イメンド内服】 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1 | 500mL | | 投与順 8 | | | | | | |
| 09 | 点滴静注 | デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:ネダプラチン+5-FU 【イメンド内服】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1 | 6.6mg 100mL | | | 投与順 2 | 投与順 2 | | | | |
| 10 | 点滴静注 | 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:ネダプラチン+5-FU 【イメンド内服】 点滴静注: *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢サブルート1 | 500mL | | | 投与順 3 | 投与順 3 | 投与順 2 | | | |
| 11 | 点滴静注 | 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:ネダプラチン+5-FU 【イメンド内服】 点滴静注: *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢サブルート1 | 500mL | | | 投与順 4 | 投与順 4 | 投与順 3 | | | |

| RP | オーダーコメント |
|----|------------|
| 05 | 5-FUと同時に開始 |