

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : HN ICT TPS 【イメト[®]・TS-1・CPFXd5-14内服】

レジメン説明 : 2015移行により生成
 2017/8/23よりDOC「EE」へ
 2018/7/20 フロゼット「テハ」→「武田テハ」の変更に伴い修正
 2018/10/16 名称に【CPFXd5-14】を追加

適用条件 : <S-1>

- ★60mg/m²を 1日2回に分けて服用
- ★2週服用→1週休薬

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※	70mg/m ²		73.5mg/m ²
05	点滴静注	(化)シス [®] ラチン点滴静注「マルコ」※	70mg/m ²		73.5mg/m ²

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6
01	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバ [®] ック「テルモ」 療法名:HN ICT TPS 【イメト [®] ・TS-1・CPFXd5-14内服】 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		07:00					
02	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバ [®] ック「テルモ」 療法名:HN ICT TPS 【イメト [®] ・TS-1・CPFXd5-14内服】 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		09:00					
03	点滴静注	テキサト注射液(テ [®] カト [®] 後発)※ アロキン静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN ICT TPS 【イメト [®] ・TS-1・CPFXd5-14内服】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 0.75mg 100mL		11:00					
04	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※ 生理食塩液 250mL プラボ [®] トル 療法名:HN ICT TPS 【イメト [®] ・TS-1・CPFXd5-14内服】 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		11:30					
05	点滴静注 <次ページあり>	(化)シス [®] ラチン点滴静注「マルコ」※	0mg		12:30					

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : HN ICT TPS 【イメト[®]・TS-1・CPFXd5-14内服】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	
		生理食塩液 500mL ソフトバ [®] ッグ「テルモ」 療法名:HN ICT TPS 【イメト [®] ・TS-1・CPFXd5-14内服】 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	300mL								
06	静注(ワンショット)	フロゼミ [®] (ラシックス後発)注20mg「武田テバ [®] 」 2mL 療法名:HN ICT TPS 【イメト [®] ・TS-1・CPFXd5-14内服】 静脈内注射 (ワンショット): 投与経路確保 末梢サブルート1	20mg		14:30						
07	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバ [®] ッグ「テルモ」 療法名:HN ICT TPS 【イメト [®] ・TS-1・CPFXd5-14内服】 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		14:30						
08	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバ [®] ッグ「テルモ」 療法名:HN ICT TPS 【イメト [®] ・TS-1・CPFXd5-14内服】 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		16:30						
09	点滴静注	デキサト注射液(デカト [®] ロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN ICT TPS 【イメト [®] ・TS-1・CPFXd5-14内服】 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	6.6mg 100mL			投与順 1	投与順 1	投与順 1			
10	点滴静注	ソルテ [®] A3AG 輸液500mL 療法名:HN ICT TPS 【イメト [®] ・TS-1・CPFXd5-14内服】 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			投与順 2	投与順 2	投与順 2	投与順 1	投与順 1	
11	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバ [®] ッグ「テルモ」 療法名:HN ICT TPS 【イメト [®] ・TS-1・CPFXd5-14内服】 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			投与順 3	投与順 3	投与順 3	投与順 2	投与順 2	
12	点滴静注	ソルテ [®] A3AG 輸液500mL 療法名:HN ICT TPS 【イメト [®] ・TS-1・CPFXd5-14内服】	500mL			投与順 4	投与順 4	投与順 4	投与順 3	投与順 3	
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : HN ICT TPS 【イメト[®]・TS-1・CPFXd5-14内服】

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	
		点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1									
13	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:HN ICT TPS 【イメト [®] ・TS-1・CPFXd5-14内服】 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL						投与順 4	投与順 4	