

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (初回)

レジメン説明 : 2015移行により生成  
 2018/7/10 ウィンDをハック製剤に変更  
 2018/7/20 フロピド「テバ」→「武田テバ」の変更に伴い修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)アビタックス注射液100mg 20mL	400mg/m2		420mg/m2
06	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	100mg/m2		105mg/m2
08	点滴静注	(化)5-FU注※	250mg/m2		262.5mg/m2
11	点滴静注	(化)5-FU注※	250mg/m2		262.5mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	点滴静注	フィジオ 35輸液 500mL 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (初回) 点滴静注: *点滴時間 7時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		01:00						
02	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (初回) 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		08:00 11:00						
03	点滴静注	デキスト注射液(デカトロン後発)※ アモキシ静注0.75mg 5mL ボラミン注 5mg 1ml 生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (初回) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 0.75mg 5mg 100mL		09:00						
04	点滴静注	(化)アビタックス注射液100mg 20mL 生理食塩液 500mL ソフトバグ「テルモ」 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (初回) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		09:30						
05	点滴静注 <次ページあり>	生理食塩液 50mL プラボトル	50mL		11:30						

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (初回)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
		療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (初回) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (初回) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 200mL		12:00						
07	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (初回) 点滴静注: *点滴時間 10時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		14:00						
08	点滴静注	(化)5-FU注※ ソルデム3A 輸液500mL 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (初回) 点滴静注: *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		14:00 19:00						
09	静注(ワンショット)	フオセミド(ラシックス後発)注20mg「武田テバ」2mL 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (初回) 静脈内注射 (ワンショット): 投与経路確保 末梢サブルート1	20mg		14:00						
10	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (初回) 点滴静注: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL			00:00	00:00	00:00			
11	点滴静注	(化)5-FU注※ ガイーンD輸液 500mL バック 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (初回) 点滴静注: *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL			00:00 06:00 12:00 18:00	00:00 06:00 12:00 18:00	00:00 06:00 12:00 18:00	00:00 06:00		
12	点滴静注 <次ページあり>	テキアト注射液(テカトロン後発)※	6.6mg			08:00	08:00	08:00			

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (初回)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
		生理食塩液 50mL フラットル 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (初回) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート2	50mL								
13	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (初回) 点滴静注: *点滴時間 12時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL						00:00		

RP	オーダーコメント
04	全量500mlに調製
07	ルートキープ
10	ルートキープ
13	ルートキープ

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (2回目以降)

レジメン説明 : 2015移行により生成  
 2018/7/10 ウィンDをバック製剤に変更  
 2018/7/20 フロゼド「テバ」→「武田テバ」の変更に伴い修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)アビタックス注射液100mg 20mL	250mg/m2		262.5mg/m2
06	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	100mg/m2		105mg/m2
09	点滴静注	(化)5-FU注※	250mg/m2		262.5mg/m2
11	点滴静注	(化)5-FU注※	250mg/m2		262.5mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	点滴静注	フジオ 35輸液 500mL 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (2回目以降) 点滴静注: *点滴時間 7時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		01:00						
02	点滴静注	ルテム3A 輸液500mL 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (2回目以降) 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		08:00 11:00						
03	点滴静注	テキサト注射液(テカトロン後発)※ アロキソ静注0.75mg 5mL ポラミン注 5mg 1ml 生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (2回目以降) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	9.9mg 0.75mg 5mg 100mL		10:00						
04	点滴静注	(化)アビタックス注射液100mg 20mL 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (2回目以降) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		10:30						
05	点滴静注 <次ページあり>	生理食塩液 50mL フラボトル	50mL		11:30						

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (2回目以降)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
		療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (2回目以降) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (2回目以降) 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 200mL		12:00						
07	静注(ワンショット)	フロセド <sup>®</sup> (ラシックス後発) 注20mg「武田テバ」 2mL 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (2回目以降) 静脈内注射 (ワンショット) : 投与経路確保 末梢サブルート1	20mg		14:00						
08	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (2回目以降) 点滴静注: *点滴時間 10時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		14:00						
09	点滴静注	(化)5-FU注※ ソルテム3A 輸液500mL 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (2回目以降) 点滴静注: *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		14:00 19:00						
10	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (2回目以降) 点滴静注: *点滴時間 24時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL			00:00	00:00	00:00			
11	点滴静注	(化)5-FU注※ ガイノール輸液 500mL バック 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (2回目以降) 点滴静注: *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL			00:00 06:00 12:00 18:00	00:00 06:00 12:00 18:00	00:00 06:00 12:00 18:00	00:00 06:00		
12	点滴静注 <次ページあり>	デキサル注射液(テカトロン後発)※	6.6mg			08:00	08:00	08:00			

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科

レジメン名称 : HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (2回目以降)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
		生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (2回目以降) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート2	50mL								
13	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN R/M CDDP+5-FU+Cmab (2回目以降) 点滴静注: *点滴時間 12時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL						00:00		

RP	オーダーコメント
04	全量250mlに調製
08	ルートキープ°
10	ルートキープ°
13	ルートキープ°