

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : HN R/M Cmab単剤(初回)※原則入院

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)アビタックス注射液100mg 20mL	400mg/m2		420mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN R/M Cmab単剤(初回)※原則入院 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1								
02	点滴静注	ポラミン注 5mg 1ml デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:HN R/M Cmab単剤(初回)※原則入院 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1	5mg 6.6mg 50mL		投与順 2								
03	点滴静注	(化)アビタックス注射液100mg 20mL 生理食塩液 500mL ソフトバグ「テルモ」 療法名:HN R/M Cmab単剤(初回)※原則入院 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 0mL		投与順 3								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	アビタックス投与30分前までに投与
03	投与速度10mg/分以下 全量500mlに調製

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通 レジメン名称 : HN R/M Cmad単剤(2回目以降)

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)アビタックス注射液100mg 20mL	250mg/m2		262.5mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:HN R/M Cmad単剤(2回目以降) 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	ホラミン注 5mg 1ml デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:HN R/M Cmad単剤(2回目以降) 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1	5mg 6.6mg 50mL		投与順 2						
03	点滴静注	(化)アビタックス注射液100mg 20mL 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:HN R/M Cmad単剤(2回目以降) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 0mL		投与順 3						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	アビタックス投与30分前までに投与
03	投与速度10mg/分以下 全量250mlに調製