

耳鼻咽喉科【melanoma】

レジメン名称 : 【1-4回目】 悪性黒色腫 nivo+ipi (耳鼻科)

レジメン説明 : 2018/7/30承認

2018/9/12 ニボルマブ80mg/bodyへ

2019/6/3 nivo→ipiの間の生食50mLに30分観察時間コメント挿入

2020/2/25 依頼有りボラミン削除

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)オプジーボ 点滴静注※	80mg		80mg
04	点滴静注	(化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL	3mg/kg		3.15mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:【1-4回目】悪性黒色腫 nivo+ipi (耳鼻科) 点滴静注: *点滴時間 150分で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		投与順 1								
02	点滴静注	(化)オプジーボ 点滴静注※ 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:【1-4回目】悪性黒色腫 nivo+ipi (耳鼻科) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 2								
03	点滴静注	生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:【1-4回目】悪性黒色腫 nivo+ipi (耳鼻科) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	50mL		投与順 3								
04	点滴静注	(化)ヤーボイ点滴静注液50mg 10mL 生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:【1-4回目】悪性黒色腫 nivo+ipi (耳鼻科) 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 4								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	0.2又は0.22µmのフィルターを使用
03	オプジーボ終了後30分かけて投与(ヤーボイ開始までの30分の観察期間用)

インターバル日数：21日

基準日：Day 1

印刷日時：2020-05-08 14:43:52

最大クール数：0クール

耳鼻咽喉科【melanoma】

レジメン名称：【1-4回目】悪性黒色腫 nivo+ipi（耳鼻科）

RP	オーダーコメント
04	最終濃度：1~4mg/mL 0.2~1.2 μ mのフィルターを使用

インターバル日数 : 14 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科【melanoma】

レジメン名称 : 【5回以降】悪性黒色腫 nivo+ipi (耳鼻科)

レジメン説明 : 2018/10/4承認

2020/2/25 依頼有りホﾟラシシ削除

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)オﾟジｰホﾟ点滴静注※	240mg		240mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キｯﾄH 療法名:【5回以降】悪性黒色腫 nivo+ipi (耳鼻科) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1								
02	点滴静注	(化)オﾟジｰホﾟ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キｯﾄH 療法名:【5回以降】悪性黒色腫 nivo+ipi (耳鼻科) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 2								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	0.2又は0.22µmのフィルターを使用

インターバル日数 : 28 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科【melanoma】

レジメン名称 : 【q4w】 【5回以降】 悪性黒色腫nivo+ipi耳鼻

レジメン説明 : 2020/9/30承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)オゾジホ点滴静注※	480mg		480mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:【q4w】 【5回以降】 悪性黒色腫nivo+ipi耳 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)オゾジホ点滴静注※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:【q4w】 【5回以降】 悪性黒色腫nivo+ipi耳 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	0.2又は0.22μmのフィルターを使用