

インターバル日数 : 7 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通 レジメン名称 : 後)Radiation+CBDCA併用療法 (Daily)

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	25mg/m2		30mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:後)Radiation+CBDCA併用療法 (Daily) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		08:00	08:00	08:00	08:00	08:00		
02	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 大塚糖液 5% 20mL プラアンプル 療法名:後)Radiation+CBDCA併用療法 (Daily) 点滴静注: *点滴時間 5分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 20mL		08:00	08:00	08:00	08:00	08:00		

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	全量20mlに調製する。