

インターバル日数 : 6 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : weekly CDDP大量動注化学療法 放射線併用

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
06	動脈注射(その他)	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	120mg/m2		126mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
01	点滴静注	スルパシリン(メキシ後発) 静注用1.5g 生食溶解液 100mL キットH 療法名:weekly CDDP大量動注化学療法 放射線併用 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	1.5g 100mL		07:30						
02	点滴静注	ラクテック注 500mL ソフトバッグ 療法名:weekly CDDP大量動注化学療法 放射線併用 点滴静注: *点滴時間 5時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		08:00 13:00						
03	点滴静注	プロイメント 点滴静注用150mg 生食溶解液 100mL キットH 療法名:weekly CDDP大量動注化学療法 放射線併用 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	150mg 100mL		08:00						
04	点滴静注	アロキ静注0.75mg 5mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:weekly CDDP大量動注化学療法 放射線併用 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 100mL		08:30						
05	筋肉注射	アトラックス-P注射液(25mg/mL) 1mL アトロピン硫酸塩注 0.5mg「タナベ」 1ml 療法名:weekly CDDP大量動注化学療法 放射線併用 筋肉注射:	25mg 0.5mg		09:00						
06	動脈注射(その他)	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 療法名:weekly CDDP大量動注化学療法 放射線併用	0mg		投与順 1						

インターバル日数 : 6 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : weekly CDDP大量動注化学療法 放射線併用

	<次ページあり>										
--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

インターバル日数 : 6 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : weekly CDDP大量動注化学療法 放射線併用

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
		動脈注射(その他):持続 *点滴時間 0分で 造影室持参									
07	点滴静注	デトキソール静注液2g 20mL(ハ ^イ アル) 療法名:weekly CDDP大量動注化学療法 放射線併用 点滴静注: *点滴時間 10時間で 投与経路:末梢サブルート1 造影室持参	0mg		投与順 2						
08	動脈注射(その他)	水性プロトニオン 20mg 生理食塩液 20mL プラアンブル 療法名:weekly CDDP大量動注化学療法 放射線併用 動脈注射(その他):ワンショット 造影室持参	20mg 20mL		投与順 3						
09	点滴静注	20%マンニトール注射液「YD」 300mL 療法名:weekly CDDP大量動注化学療法 放射線併用 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢サブルート2	200mL		投与順 4						
10	点滴静注	スルハシリン(ユシシ後発)静注用1.5g 生食溶解液 100mL キットH 療法名:weekly CDDP大量動注化学療法 放射線併用 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	1.5g 100mL		投与順 5						
11	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:weekly CDDP大量動注化学療法 放射線併用 点滴静注: *点滴速度 100m l/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		3回						
12	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:weekly CDDP大量動注化学療法 放射線併用 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL			00:00 04:00 08:00					
13	点滴静注	ラクテック注 500mL ソフトバック 療法名:weekly CDDP大量動注化学療法 放射線併用 点滴静注:	500mL			12:00 18:00					
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 6 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : weekly CDDP大量動注化学療法 放射線併用

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3				
		*点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1									
14	点滴静注	20%マンニトール注射液「YD」 300mL 療法名:weekly CDDP大量動注化学療法 放射線併用 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢サブルート1	200mL			投与順 1					
15	点滴静注	スルパシリン(マシン後発) 静注用1.5g 生食溶解液 100mL キットH 療法名:weekly CDDP大量動注化学療法 放射線併用 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	1.5g 100mL			2回	2回				
16	点滴静注	ラクテック注 500mL ソフトバッグ 療法名:weekly CDDP大量動注化学療法 放射線併用 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL				00:00 06:00				

RP	オーダーコメント
05	搬入直前に筋注
06	Seldinger法
07	CDDP動注開始時から持続iv デトキソール : 16.8g (168mL) /m ² CDDP100mgあたり140mL
08	CDDP投与後動注
11	18:00-24:00 残破棄
16	0:00~