

age : 1/1 期間 : Day1~Day1

印刷日時 : 2022-05-26 11:07:16

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

耳鼻咽喉科【melanoma】 レジメン名称 : 悪性黒色腫 pembrolizumab術後補助 (耳鼻)

レジメン説明 : 2019/1/29適応追加による承認
2021/1/20 同時申請

適用条件 :

除外条件 :

ト表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

UC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)キイトルダ [®] 点滴静注※	200mg		200mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:悪性黒色腫 pembrolizumab術後補助 (耳鼻) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1						
02	点滴静注	(化)キイトルダ [®] 点滴静注※ 生理食塩液 50mL プラネト [®] 療法名:悪性黒色腫 pembrolizumab術後補助 (耳鼻) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 2						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	インラインフィルター (0.2~5μm) を使用すること 希釈後の濃度が1~10mg/mLとなること