

インターバル日数 : 42 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科 【MSI-High】 レジメン名称 : 【q6w】 Pembrolizumab MSI-High 婦人科

レジメン説明 : 2020/9/4承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:  $\text{体重}(\text{kg})^{0.425} \times \text{身長}(\text{cm})^{0.725} \times 0.007184$  女性用:  $\text{体重}(\text{kg})^{0.425} \times \text{身長}(\text{cm})^{0.725} \times 0.007184$

AUC計算式 : 男性用:  $\text{AUC} \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} / (72 \times \text{CRE}) + 25)$  女性用:  $\text{AUC} \times ((140 - \text{年齢}) \times \text{体重} \times 0.85 / (72 \times \text{CRE}) + 25)$

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
02	点滴静注	(化)キイトルーダ <sup>®</sup> 点滴静注※	400mg		400mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名: 【q6w】 Pembrolizumab MSI-High 婦人科 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		投与順 1								
02	点滴静注	(化)キイトルーダ <sup>®</sup> 点滴静注※ 生理食塩液 50mL プラボ <sup>®</sup> トル 療法名: 【q6w】 Pembrolizumab MSI-High 婦人科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 50mL		投与順 2								

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
02	インラインフィルター (0.2~5μm) を使用すること 希釈後の濃度が1~10mg/mLとなること