

インターバル日数 : 1 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科 【異所性妊娠】 レジメン名称 : 異所性妊娠 MTX

レジメン説明 : 2018/7/4レジメン委員会承認  
2018/10 倫理委員会承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	筋肉注射	(化)メトトレキサート注射液※	50mg/m2		52.5mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	筋肉注射	(化)メトトレキサート注射液※ 注射用蒸留水 5mL 療法名:異所性妊娠 MTX 筋肉注射:	0mg 4mL		1回						

RP	オーダーコメント
01	Day4, 7でhCGに15%以上の低下がなければ2回目筋注 <薬剤調製時>MTX 50mg/Vあたり2mLの注射用水で溶解し必要量を採取する。