





インターバル日数 : 19 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科

レジメン名称 : 子宮平滑筋肉腫 GD (GEM+DTX) 療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8							
01	点滴静注	生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:子宮平滑筋肉腫 GD (GEM+DTX) 療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL									
02	点滴静注	グレーストン静注液3mg「NK」 3mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:子宮平滑筋肉腫 GD (GEM+DTX) 療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 100mL									
03	点滴静注	(化)ゲムシタヒン点滴静注用「ヤルト」※ 大塚糖液 5% 100mL プラボトル 療法名:子宮平滑筋肉腫 GD (GEM+DTX) 療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL									
04	点滴静注	生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:子宮平滑筋肉腫 GD (GEM+DTX) 療法 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		09:30							
05	点滴静注	グレーストン静注液3mg「NK」 3mL テキアト注射液(テカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:子宮平滑筋肉腫 GD (GEM+DTX) 療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 6.6mg 100mL		10:00							
06	点滴静注	(化)トセキセル点滴静注「EE」※ 大塚糖液 5% 250mL プラボトル 療法名:子宮平滑筋肉腫 GD (GEM+DTX) 療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		10:30							
07	点滴静注	(化)ゲムシタヒン点滴静注用「ヤルト」※ 大塚糖液 5% 100mL プラボトル 療法名:子宮平滑筋肉腫 GD (GEM+DTX) 療法	0mg 100mL		11:30							
	<次ページあり>											

インターバル日数 : 19 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科

レジメン名称 : 子宮平滑筋肉腫 GD (GEM+DTX) 療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
		点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1									

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
05	タキソテール投与前に