

婦人科

レジメン名称 : トラベクテジン療法 婦人科

レジメン説明 : 2017/9/26承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	中心静脈注射	(化)【要予約】ヨネデリス点滴静注用※	1.2mg/m2		1.26mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2					
01	中心静脈注射	生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:トラベクテジン療法 婦人科 中心静脈注射: *点滴時間 25時間で 投与経路:CVルートメイン1	250mL		09:30						
02	中心静脈注射	アロキン静注0.75mg 5mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:トラベクテジン療法 婦人科 中心静脈注射: *点滴時間 30分で 投与経路:CVサブルート1	0.75mg 16.5mg 100mL		10:00						
03	中心静脈注射	(化)【要予約】ヨネデリス点滴静注用※ 生理食塩液1000mL ソフトハック「テルモ」 療法名:トラベクテジン療法 婦人科 中心静脈注射: *点滴時間 24時間で 投与経路:CVサブルート1	0mg 1L		10:30						
04	中心静脈注射	生理食塩液 50mL プラボトル 療法名:トラベクテジン療法 婦人科 中心静脈注射: *点滴時間 10分で 投与経路:CVサブルート1	50mL			10:30					

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	必ず中心静脈から投与すること