

婦人科 【侵入奇胎】 レジメン名称 : 侵入奇胎 ACTD療法 婦人科

レジメン説明 : 2017/7/4 診療科の手順書に従って、制吐剤 (アロキシ、デキサト) を組み込んだ。
2018/3/13 コスマゲン[®]の投与量が1mLだとコースト[®]Cに15%程度取られてしまうため、ロスを減らすために生食19mLを追加。

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	緩徐に静注	(化)コスマゲン [®] 静注用 0.5mg	0.5mg		0.5mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	点滴静注	ソルデム3A 輸液200mL 療法名:侵入奇胎 ACTD療法 婦人科 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	200mL		09:30	09:30	09:30	09:30	09:30		
02	点滴静注	アロキシ静注0.75mg 5mL デキサト注射液(デキサトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:侵入奇胎 ACTD療法 婦人科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 6.6mg 100mL		09:30						
03	緩徐に静注	(化)コスマゲン [®] 静注用 0.5mg 注射用蒸留水 5mL 生理食塩液 20mL プラアンプル 療法名:侵入奇胎 ACTD療法 婦人科 緩徐に静注: 投与経路確保 末梢サブルート1	0mg 1mL 19mL		10:00	10:00	10:00	10:00	10:00		
04	点滴静注	デキサト注射液(デキサトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:侵入奇胎 ACTD療法 婦人科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL			09:30	09:30	09:30	09:30		

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	コスマゲン1mL (0.5mg) +生食19mLでtotal 20mL