

インターバル日数 : 14 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科 【侵入奇胎】 レジメン名称 : 侵入奇胎 ムトレキセト 婦人科

レジメン説明 : 2017/5/1 医師より依頼有り、インターバル19→14日に変更
2019/2/21 婦人科医師より依頼有り、投与量を10mg 1日2回→20mg 1日1回に変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	筋肉注射	(化)ムトレキセト注射液※	20mg		20mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5		
01	筋肉注射	(化)ムトレキセト注射液※ 注射用蒸留水 5mL 療法名:侵入奇胎 ムトレキセト 婦人科 筋肉注射:	0mg 2mL		1回	1回	1回	1回	1回		

RP	オーダーコメント
01	<薬剤調製時>MTX 50mg/Vあたり2mLの注射用水で溶解し必要量(0.8mL)を採取する