

婦人科 レジメン名称：MTX + LV救援（内服）療法

レジメン説明：2015移行により生成
2019/2/21 婦人科医師より依頼有り、0.5mg/kg 1日2回→1mg/kg 1日1回に変更。またロイホリンは注射→内服へ

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式： 男性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184 女性用:体重(kg)^0.425 × 身長(cm)^0.725 × 0.007184

AUC計算式： 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
01	筋肉注射	(化)メトトレート注射液※	1mg/kg		1.05mg/kg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	筋肉注射	(化)メトトレート注射液※ 注射用蒸留水 5mL 療法名:MTX + LV救援（内服）療法 筋肉注射:	0mg 4mL		1回		1回		1回		1回

RP	オーダーコメント
01	<薬剤調製時>MTX 50mg/Vあたり2mLの注射用水で溶解し必要量を採取する