

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科 レジメン名称 : 卵巣癌 TC療法 (Paclitaxel+CBDCA)

レジメン説明 : 2015移行により生成
2019/9/26 サンタック→ガスターへ変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用: 体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用: AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	180mg/m2		181mg/m2
04	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		1000mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生理食塩液 250mL プラボトル 療法名: 卵巣癌 TC療法 (Paclitaxel+CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 6時間で 投与経路: 末梢ルートメイン1	250mL		09:30						
02	点滴静注	デキスト注射液(デカトロン後発)※ ボラミン注 5mg 1ml ガスター注射液20mg 2mL アロキ静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名: 卵巣癌 TC療法 (Paclitaxel+CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路: 末梢サブルート1	16.5mg 5mg 20mg 0.75mg 100mL		10:00						
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 療法名: 卵巣癌 TC療法 (Paclitaxel+CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 500mL		10:30						
04	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名: 卵巣癌 TC療法 (Paclitaxel+CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路: 末梢サブルート1	0mg 250mL		13:30						

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科

レジメン名称 : 卵巣癌 TC療法 (Paclitaxel+CBDCA)

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ