

婦人科 レジメン名称 : TC (Paclitaxel+CBDCA)+Bevacizumab療法

レジメン説明 : 2017/5/16 医師より依頼有り、グラニセトロン→アロキシに修正  
 2019/2/18 婦人科医局会確認のもとBev→TCに投与順序変更 (CBDCAアレルギーによるBev中止を避けるため)  
 2019/9/26 ザンタック→ガスターへ変更

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)アパ スチン点滴静注用※	15mg/kg		15.8mg/kg
04	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	180mg/m2		189mg/m2
05	点滴静注	(化)カルボプ ラチン点滴静注液「サト」※	0mg		1000mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:TC (Paclitaxel+CBDCA)+Bevacizumab療法 点滴静注: *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		09:30						
02	点滴静注	ポ ラミン注 5mg 1ml ガスター注射液20mg 2mL テキート注射液(テカト ン後発)※ アロキシ静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:TC (Paclitaxel+CBDCA)+Bevacizumab療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	5mg 20mg 16.5mg 0.75mg 100mL		10:00						
03	点滴静注	(化)アパ スチン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:TC (Paclitaxel+CBDCA)+Bevacizumab療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		10:30						
04	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ 療法名:TC (Paclitaxel+CBDCA)+Bevacizumab療法 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		12:00						
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科

レジメン名称 : TC (Paclitaxel+CBDCA)+Bevacizumab療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:TC (Paclitaxel+CBDCA)+Bevacizumab療法 点滴静注: *点滴時間 60分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		15:00						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	初回90分、次回から60~30分まで短縮可