

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科

レジメン名称 : 卵巣癌 TP (Paclitaxel + CDDP) 療法

レジメン説明 : 2020/6/26承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	175mg/m2		183.75mg/m2
06	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	70mg/m2		73.5mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1							
01	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトパック「テルモ」 療法名:卵巣癌 TP (Paclitaxel + CDDP) 療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		07:00							
02	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトパック「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:卵巣癌 TP (Paclitaxel + CDDP) 療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 8mL		09:00							
03	点滴静注	アピキ静注0.75mg 5mL デキスト注射液(デカトロン後発)※ ホラミン注 5mg 1ml カスター注射液20mg 2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:卵巣癌 TP (Paclitaxel + CDDP) 療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 5mg 20mg 100mL		11:00							
04	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトパック 療法名:卵巣癌 TP (Paclitaxel + CDDP) 療法 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		11:30							
05	点滴静注	20%マンニトール注射液「YD」 300mL 療法名:卵巣癌 TP (Paclitaxel + CDDP) 療法 点滴静注:	300mL		14:30							
	<次ページあり>											

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科

レジメン名称 : 卵巣癌 TP (Paclitaxel + CDDP) 療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		*点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:卵巣癌 TP (Paclitaxel + CDDP) 療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		15:30						
07	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:卵巣癌 TP (Paclitaxel + CDDP) 療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		17:30 19:30 21:30						

RP	オーダーコメント
02	ルートキープ
04	0.22μm以下のフィルター使用
06	全量500mL

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科

レジメン名称 : 子宮頸癌 TP (Paclitaxel + CDDP) 療法

レジメン説明 : 2020/6/26承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	175mg/m2		183.75mg/m2
06	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	50mg/m2		52.5mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトパック「テルモ」 療法名:子宮頸癌 TP (Paclitaxel + CDDP) 療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		07:00						
02	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトパック「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:子宮頸癌 TP (Paclitaxel + CDDP) 療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 8mL		09:00						
03	点滴静注	アロキシ静注0.75mg 5mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ ポラミン注 5mg 1ml カスター注射液20mg 2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:子宮頸癌 TP (Paclitaxel + CDDP) 療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 5mg 20mg 100mL		11:00						
04	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトパック 療法名:子宮頸癌 TP (Paclitaxel + CDDP) 療法 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		11:30						
05	点滴静注	20%マンニトール注射液「YD」 300mL 療法名:子宮頸癌 TP (Paclitaxel + CDDP) 療法 点滴静注:	300mL		14:30						
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科

レジメン名称 : 子宮頸癌 TP (Paclitaxel + CDDP) 療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		*点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:子宮頸癌 TP (Paclitaxel + CDDP) 療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		15:30						
07	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:子宮頸癌 TP (Paclitaxel + CDDP) 療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		17:30 19:30 21:30						

RP	オーダーコメント
02	ルートキープ
04	0.22 $\mu$ m以下のフィルター使用
06	全量500mL