

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科

レジメン名称 : 子宮頸癌 TP + Bevacizumab療法

レジメン説明 : 2020/6/26承認

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
04	点滴静注	(化)アバスタチン点滴静注用※	15mg/kg		15.75mg/kg
05	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	175mg/m2		183.75mg/m2
07	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	50mg/m2		52.5mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1								
01	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 療法名:子宮頸癌 TP + Bevacizumab療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		07:00								
02	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバッグ「テルモ」 硫酸Mg補正液1mEq/mL 20mL 療法名:子宮頸癌 TP + Bevacizumab療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL 8mL		09:00								
03	点滴静注	アロキン静注0.75mg 5mL デキスト注射液(デカトロン後発)※ ホウラン注 5mg 1mL カスター注射液20mg 2mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:子宮頸癌 TP + Bevacizumab療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 9.9mg 5mg 20mg 100mL		11:00								
04	点滴静注	(化)アバスタチン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:子宮頸癌 TP + Bevacizumab療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		11:30								
05	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 500mL ソフトバッグ	0mg 500mL		13:00								
	<次ページあり>												

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科

レジメン名称 : 子宮頸癌 TP + Bevacizumab療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		療法名:子宮頸癌 TP + Bevacizumab療法 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢サブルート1									
06	点滴静注	20%マンニトール注射液「YD」 300mL 療法名:子宮頸癌 TP + Bevacizumab療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	300mL		16:00						
07	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:子宮頸癌 TP + Bevacizumab療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 500mL		17:00						
08	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:子宮頸癌 TP + Bevacizumab療法 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		19:00 21:00						

RP	オーダーコメント
02	ルートキープ
04	忍容性が良ければ、2回目60分、3回目以降30分まで短縮可
05	0.22μm以下のフィルター使用
07	全量500mL