

インターバル日数： 21 日 基準日： Day 1

最大クール数： 0クール

婦人科 レジメン名称： 後)Weekly TC療法 (Paclitaxel+ CBDCA) 婦人科

レジメン説明： 2015移行により生成
2019/9/26 ザンタック→ガスターへ変更

適用条件：

除外条件：

体表面積計算式： 男性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用：体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式： 男性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用：AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤：

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※	80mg/m2		84mg/m2
04	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サント」※	0mg		300mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液200mL 療法名：後)Weekly TC療法 (Paclitaxel+ CBDCA) 婦人科 点滴静注： *点滴速度 100m l /hr 投与経路：末梢ルートメイン1	200mL		09:30						
02	点滴静注	デキスト注射液(デキストロン後発)※ ボラミン注 5mg 1ml ガスター注射液20mg 2mL クワンセトロン点滴静注パック 3mg/100mL「NK」 療法名：後)Weekly TC療法 (Paclitaxel+ CBDCA) 婦人科 点滴静注： *点滴時間 30分で 投与経路：末梢サブルート1	6.6mg 5mg 20mg 3mg		10:00						
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 250mL フラボトル 療法名：後)Weekly TC療法 (Paclitaxel+ CBDCA) 婦人科 点滴静注： *点滴時間 1時間で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 250mL		10:30						
04	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サント」※ 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名：後)Weekly TC療法 (Paclitaxel+ CBDCA) 婦人科 点滴静注： *点滴時間 1時間で 投与経路：末梢サブルート1	0mg 250mL		11:30						
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 21 日

基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科

レジメン名称 : 後)Weekly TC療法 (Paclitaxel+CBDCA) 婦人科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day15						
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液200mL 療法名:後)Weekly TC療法 (Paclitaxel+CBDCA) 婦人科 点滴静注: *点滴速度 100ml/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	200mL		09:30						
02	点滴静注	デキスト注射液(デキスト後発)※ ホラミン注 5mg 1ml カスター注射液20mg 2mL グラネセロン点滴静注パック 3mg/100mL「NK」 療法名:後)Weekly TC療法 (Paclitaxel+CBDCA) 婦人科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 5mg 20mg 3mg		10:00						
03	点滴静注	(化)パクリタキセル点滴静注液※ 大塚糖液 5% 250mL フラボトル 療法名:後)Weekly TC療法 (Paclitaxel+CBDCA) 婦人科 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		10:30						
04	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:後)Weekly TC療法 (Paclitaxel+CBDCA) 婦人科 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		11:30						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ