

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科 レジメン名称 : 後)DC療法 (Docetaxel+CBDCA) 婦人科

レジメン説明 : 2015移行により生成  
2017/8/23よりDOC「EE」へ

適用条件 :  
除外条件 :  
体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184  
AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)ドセタキセル点滴静注「EE」※	70mg/m2		71mg/m2
04	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		1000mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	ソルテム3A 輸液200mL 療法名:後)DC療法 (Docetaxel+CBDCA) 婦人科 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	200mL		09:30						
02	点滴静注	テキアト注射液(テカトロン後発)※ グラネセトロン点滴静注パック 3mg/100mL「NK」 療法名:後)DC療法 (Docetaxel+CBDCA) 婦人科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 3mg		10:00						
03	点滴静注	(化)ドセタキセル点滴静注「EE」※ 大塚糖液 5% 250mL フラボトル 療法名:後)DC療法 (Docetaxel+CBDCA) 婦人科 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		10:30						
04	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:後)DC療法 (Docetaxel+CBDCA) 婦人科 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		11:30						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ