

婦人科

レジメン名称 : DC (DTX+CBDCA)+Bevacizumab療法

レジメン説明 : 2015移行により生成
2017/8/23よりDOC「EE」へ
2019/2/18 婦人科医局会確認のもとBev→DCに投与順序変更 (CBDCAアレルギーによるBev中止を避けるため)

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤 :

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)アバ`スチン点滴静注用※	15mg/kg		15.8mg/kg
04	点滴静注	(化)ト`セタキセル点滴静注「EE」※	70mg/m2		73.5mg/m2
05	点滴静注	(化)カルボ`プラチン点滴静注液「サト`」※	0mg		1000mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	生理食塩液 250mL フ`ラボ`トル 療法名:DC (DTX+CBDCA)+Bevacizumab療法 点滴静注: *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		09:30						
02	点滴静注	テ`キアト注射液(テ`カト`ン後発)※ ア`ロキ`ン静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:DC (DTX+CBDCA)+Bevacizumab療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 0.75mg 100mL		10:00						
03	点滴静注	(化)アバ`スチン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:DC (DTX+CBDCA)+Bevacizumab療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		10:30						
04	点滴静注	(化)ト`セタキセル点滴静注「EE」※ 大塚糖液 5% 250mL フ`ラボ`トル 療法名:DC (DTX+CBDCA)+Bevacizumab療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		12:00						
05	点滴静注 <次ページあり>	(化)カルボ`プラチン点滴静注液「サト`」※ 生理食塩液 250mL フ`ラボ`トル	0mg 250mL		13:00						

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科

レジメン名称 : DC (DTX+CBDCA) +Bevacizumab療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		療法名:DC (DTX+CBDCA) +Bevacizumab療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1									

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	忍容性良ければ、2回目60分、3回目以降30分まで短縮可