

婦人科 レジメン名称 : DP (Docetaxel+CDDP)療法 婦人科

レジメン説明 : 2015移行により生成
 2017/8/23よりDOC「EE」へ
 2018/8/10 ウィンFバックに変更のため修正

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)ドセタキセル点滴静注「EE」※	70mg/m2		74mg/m2
07	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※	60mg/m2		63mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2					
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:DP (Docetaxel+CDDP)療法 婦人科 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		09:30						
02	点滴静注	デキスト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:DP (Docetaxel+CDDP)療法 婦人科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 100mL		10:00						
03	点滴静注	(化)ドセタキセル点滴静注「EE」※ 大塚糖液 5% 250mL フラボトル 療法名:DP (Docetaxel+CDDP)療法 婦人科 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		10:30						
04	点滴静注	ウィンF輸液 500mL バック 療法名:DP (Docetaxel+CDDP)療法 婦人科 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		11:30						
05	点滴静注	生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:DP (Docetaxel+CDDP)療法 婦人科 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		13:30						
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科

レジメン名称 : DP (Docetaxel+CDDP)療法 婦人科

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2					
06	点滴静注	ドセタキセル注射液(ドセタキセル後発)※ アピキ静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:DP (Docetaxel+CDDP)療法 婦人科 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 0.75mg 100mL		14:30						
07	点滴静注	(化)シスプラチン点滴静注「マルコ」※ 生理食塩液 500mL ソフトバグ「テルモ」 療法名:DP (Docetaxel+CDDP)療法 婦人科 点滴静注: *点滴時間 2時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 300mL		15:00						
08	点滴静注	ソルテム3A 輸液500mL 療法名:DP (Docetaxel+CDDP)療法 婦人科 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		17:00 20:00	02:00 05:00 11:00					
09	点滴静注	生理食塩液 500mL ソフトバグ「テルモ」 療法名:DP (Docetaxel+CDDP)療法 婦人科 点滴静注: *点滴時間 3時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		23:00	08:00					

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ