

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : Doxil療法 (90mg/body未満) 婦人科

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184 女性用:体重(kg)<sup>0.425</sup> × 身長(cm)<sup>0.725</sup> × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)ドキシル注20mg 10mL	50mg/m2		52.5mg/m2

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	ルテムA3A 輸液500mL 療法名:Doxil療法 (90mg/body未満) 婦人科 点滴静注: *点滴速度 100m l/hr 投与経路:末梢ルートメイン1	500mL		09:00						
02	点滴静注	テキアト注射液(テカト ン後発)※ ホララミン注 5mg 1ml 生食溶解液 100mL キットH 療法名:Doxil療法 (90mg/body未満) 婦人科 点滴静注: *点滴時間 0.5時間で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 5mg 100mL		09:30						
03	点滴静注	(化)ドキシル注20mg 10mL 大塚糖液 5% 250mL フラホトル 療法名:Doxil療法 (90mg/body未満) 婦人科 点滴静注: *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		10:00						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ用
03	Doxil終了後、残りを点滴静注 1mg/minを超えない速度で投与 フィルターを通さないこと