

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通 レジメン名称 : トキシル+CBDCA療法 (PLD+CBDCA)

レジメン説明 : 2015移行により生成

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) +25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) +25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)トキシル注20mg 10mL	30mg/m2		31.5mg/m2
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		1000mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
01	点滴静注	リルデム3A 輸液200mL 療法名:トキシル+CBDCA療法 (PLD+CBDCA) 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢ルートメイン1	200mL		09:30						
02	点滴静注	デキサト注射液(デカトロン後発)※ ボラミン注 5mg 1ml アロキ静注0.75mg 5mL 生食溶解液 100mL キットH 療法名:トキシル+CBDCA療法 (PLD+CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	6.6mg 5mg 0.75mg 100mL		10:00						
03	点滴静注	(化)トキシル注20mg 10mL 大塚糖液 5% 250mL フラボトル 療法名:トキシル+CBDCA療法 (PLD+CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 1.5時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL		10:30						
04	点滴静注	生理食塩液 50mL フラボトル 療法名:トキシル+CBDCA療法 (PLD+CBDCA) 点滴静注: *点滴速度 100m l /hr 投与経路:末梢サブルート1	50mL		12:00						
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 500mL ソフトバック「テルモ」 療法名:トキシル+CBDCA療法 (PLD+CBDCA) 点滴静注: *点滴時間 2.5時間で	0mg 500mL		12:30						

<次ページあり>

インターバル日数 : 28 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

共通

レジメン名称 : ドキシル+CBDCA療法 (PLD+CBDCA)

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1						
		投与経路:末梢サブルート1									

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	フィルターを通さないこと