

共通

レジメン名称 : 卵巣癌 GC(GEM+CBDCA)療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
01	点滴静注	生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:卵巣癌 GC(GEM+CBDCA)療法 点滴静注: *点滴時間 6時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	250mL		09:30						
02	点滴静注	ゲラネセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 デキサト注射液(デキサメタゾン後発)※ 療法名:卵巣癌 GC(GEM+CBDCA)療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg 9.9mg								
03	点滴静注	(化)ゲムシタビン点滴静注用「ヤルト」※ 大塚糖液 5% 100mL プラボトル 療法名:卵巣癌 GC(GEM+CBDCA)療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		10:30						
04	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サント」※ 生理食塩液 250mL プラボトル 療法名:卵巣癌 GC(GEM+CBDCA)療法 点滴静注: *点滴時間 1時間で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 250mL								
05	点滴静注	ゲラネセトロン点滴静注バッグ 3mg/100mL「NK」 療法名:卵巣癌 GC(GEM+CBDCA)療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	3mg		10:00						