

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科

レジメン名称 : GC (GEM + CBDCA) + BEV療法

レジメン説明 : 2017/9/26承認

2020/1/20 Bevの投与順序を最初に変更 (高額であるためCBDCAアレルギーによる中止を避けるため)

適用条件 :

除外条件 :

体表面積計算式 : 男性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184 女性用:体重(kg)^{0.425} × 身長(cm)^{0.725} × 0.007184

AUC計算式 : 男性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 / (72 × CRE) + 25) 女性用:AUC × ((140-年齢) × 体重 × 0.85 / (72 × CRE) + 25)

使用する抗がん剤:

RP	手技	薬剤名称	標準値(1回量)	標準値	上限値
03	点滴静注	(化)アパースチン点滴静注用※	15mg/kg		15.75mg/kg
04	点滴静注	(化)ゲムシタビオン点滴静注用「ヤクルト」※	1000mg/m2		1050mg/m2
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※	0mg		900mg

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day1	Day2	Day3	Day4	Day5	Day6	Day7
01	点滴静注	生食溶解液 100mL キットH 療法名:GC (GEM + CBDCA) + BEV療法 点滴静注: *点滴時間 4時間で 投与経路:末梢ルートメイン1	100mL		09:30						
02	点滴静注	アロキシ静注0.75mg 5mL デキサト注射液(デカトロン後発)※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:GC (GEM + CBDCA) + BEV療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0.75mg 6.6mg 100mL		10:00						
03	点滴静注	(化)アパースチン点滴静注用※ 生食溶解液 100mL キットH 療法名:GC (GEM + CBDCA) + BEV療法 点滴静注: *点滴時間 90分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		10:30						
04	点滴静注	(化)ゲムシタビオン点滴静注用「ヤクルト」※ 大塚糖液 5% 100mL フラボトル 療法名:GC (GEM + CBDCA) + BEV療法 点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1	0mg 100mL		12:00						
05	点滴静注	(化)カルボプラチン点滴静注液「サト」※ 生理食塩液 250mL フラボトル 療法名:GC (GEM + CBDCA) + BEV療法	0mg 250mL		12:30						
	<次ページあり>										

インターバル日数 : 21 日 基準日 : Day 1

最大クール数 : 0クール

婦人科

レジメン名称 : GC (GEM + CBDCA) + BEV療法

RP	手技	薬剤名称	用量/単位	処方1回量	Day8						
		点滴静注: *点滴時間 30分で 投与経路:末梢サブルート1									
08	点滴静注	大塚糖液 5% 50mL プラボトル 療法名:GC (GEM + CBDCA) + BEV療法 点滴静注: *点滴時間 10分で 投与経路:末梢サブルート1	50mL		11:00						

RP	オーダーコメント
01	ルートキープ
03	2回目は60分、3回目以降は30分に短縮可
06	フラッシュ
08	フラッシュ